

E Z CAT

Sulfato de Bario

suspensión concentrada para
tomografía axial computada
Agítese bien antes de usar.

FÓRMULA:

Sulfato de Bario 4,6% p/p con agentes dispersantes y suspensores, resinas vegetales, agentes conservadores, antiespumante, aromatizantes naturales y artificiales, edulcorante artificial y agua.

INDICACIONES:

Para uso en Tomografía Axial Computada, para opacificar el tracto gastrointestinal.

FARMACOLOGÍA:

E Z CAT es fisiológicamente inerte, careciendo de toda actividad farmacológica y de valor terapéutico. E Z CAT está destinado solamente al uso como ayuda diagnóstica.

CONTRAINDICACIONES:

No deberá usarse el Sulfato de Bario en posición proximal a una obstrucción de colon o en presencia de perforación gastrointestinal sospechada o inminente.
La hipersensibilidad confirmada a los productos baritados constituye una contraindicación a su uso.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Verter el contenido de E Z CAT en un recipiente de 1 litro. Añadir agua hasta justo por debajo del nivel rasante superior. Cerrar la tapa y agitar bien el recipiente. Volumen final: 900 ml de suspensión de

Sulfato de Bario al 1,1% p/p (p/v). Alternativamente, la suspensión de Bario E Z CAT puede mezclarse para rendir una concentración distinta. Damos a continuación algunas sugerencias.

- Añadir el contenido de E Z CAT al recipiente para mezclar, y añadir agua hasta el nivel de 700 ml. Ello rinde una suspensión al 1,4% p/p (p/v).
 - Añadir agua hasta el nivel de 600 ml. Ello rinde una suspensión al 1,7% p/p (p/v).
 - Añadir agua hasta el nivel de 500 ml. Ello rinde una suspensión al 2,0% p/p (p/v).
- Después de efectuada la mezcla, verter 350-450 ml de la suspensión en un vaso, haciendo que la beba el paciente $\frac{1}{2}$ hora antes de efectuarse el barrido tomográfico y luego, 5 minutos antes de dicho barrido, dándole a beber el volumen restante.

CONTENIDO:

Envase conteniendo 225 ml

EZ GAS II

Gránulos Efervescentes

Fórmula

Bicarbonato de Sodio	2.21gr
Acido Cítrico	1.53gr
Simeticona	0.04gr

Gránulos efervescentes sabor naranja para exámenes radiográficos de doble contraste de tubo digestivo superior.

Dosis: la que el médico señale

Producto especialmente desarrollado para producir gas CO₂ para estudios radiográficos de doble contraste con Sulfato de Bario de HD.

Precauciones

No se administre en caso de que se sospeche obstrucción esofágica.

No utilizar para tratar de remover cuerpos extraños atorados a nivel esofágico

Utilizar solo bajo supervisión médica, si el paciente se encuentra sujeto a una dieta baja en sodio.

No tomar más de la dosis recomendada en 24 horas, según se enlista a continuación:

Adultos menores de 60 años 4 paquetes en 24hrs
Adultos mayores de 60 años 3 paquetes en 24 hrs
Niños de 3-12 años Consulte a su médico tratante

En caso de sobredosis, consulte a su médico

Manténgase fuera del alcance de los niños

Una vez abierto el paquete, deseche la cantidad no utilizada

Conservación: protéjase de la humedad, consérvase en un rango de temperatura de 15 a 30 grados centígrados

Fabricado por Tower Laboratories LTD
Dirección 8 Industrial Park RD Centerbrook CT
06409USA

Fabricado para E-Z-EM Inc.,
Dirección: 111 Marcus Avenue, Suite LL-26, Lake Success, Nueva York 11049 USA