

Iomeron®
350 mg Iodo/ml
solución inyectable
Iomeprol

Composición: 1 ml contiene 714,4 mg de iomeprol
 (equivalentes a 350 mg de iodo).
 Un frasco de 500 ml contiene 357,20 g de iomeprol
 (equivalentes a 175 g de iodo).
 Excipientes: trometamol, ácido clorhídrico y agua para preparaciones
 inyectables.

901173
 OH

Vía intravenosa,
 intraarterial,
 intracolangiopancreática,
 intraarticular, intrauterina,
 intramamaria e
 intraglandular

500 ml



Titular: Bracco Imaging s.p.a. Via E. Folli 50 - 20134 Milán (Italia)
 Representante local: Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
 Realizar una única perforación.
 Conservar el frasco en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.
 Frasco multidosis.
 Administración mediante inyector automático.
 Desechar la solución sobrante en el plazo de ocho horas.

Iomeron® 350
 500 ml

Lote:

Lote:
 CAD

Lote:

EUROPE 24 MAMMAGRAFICO

Spanish	English
Iomeron	Iomeron
350 mg Iodo/ml	350 mg Iodine/ml
solución inyectable	Solution for injection
Iomeprol	Iomeprol
Vía intravenosa, intraarterial, intracolangiopancreática, intraarticular, intrauterina, intramamaria e intraglandular.	For injection intravenous, intra-arterial, intracholangiopancreatic, intra-articular, intrauterine, intramammary and intraglandular.
500 ml	500 ml
Composición: 1 ml contiene 714,4 mg de iomeprol (equivalentes a 350 mg de iodo).	Composition: 1ml contains 714.4 mg of iomeprol (equivalent to 350 mg iodine)
Un frasco de 500 ml contiene 357,20 g de iomeprol (equivalentes a 175 g de iodo).	A bottle of 500ml contains 357.20 g of iomeprol (equivalent to 175 g iodine)
Excipientes: trometamol, ácido clorhídrico y agua para preparaciones inyectables.	Excipients: Trometamol, hydrochloric acid and water for injections
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños	Keep out of the sight and reach of children
Realizar una única perforación	The rubber stopper should be pierced only once.
Conservar el frasco en el embalaje exterior para protegerlo de la luz	Keep the bottle in the carton to protect it from light.
Frasco multidosis	Multi-dose container
Administración mediante inyector automático	To be used with an automatic injector only
Desechar la solución sobrante en el plazo de ocho horas	Any unused product should be discarded within eight hours after opening.
Titular: Bracco Imaging s.p.a.	Marketing Authorisation Holder: Bracco Imaging s.p.a.
Via E.Folli 50 - 20134 Milán (Italia)	Via E.Folli 50 - 20134 Milan (Italy)
Representante local:	Local Representative:

Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A.	Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A.
Lote: LP2807A CAD: 02-2027	Batch: LP2807A Expiry: 02-2027