


— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2026年5月



環状型非イオン性 MRI 用造影剤  
ガドテリドール注射液

処方箋医薬品<sup>注</sup>

プロハンス<sup>®</sup> 静注 5mL      プロハンス<sup>®</sup> 静注シリンジ 13mL  
プロハンス<sup>®</sup> 静注 10mL      プロハンス<sup>®</sup> 静注シリンジ 17mL  
プロハンス<sup>®</sup> 静注 15mL  
プロハンス<sup>®</sup> 静注 20mL

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂いたしました。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### [改訂内容]

下線部 ( ) を改訂

改訂後	改訂前
11. 副作用 (省略) 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明) ショックを起こすことがある。呼吸困難、失神、昏迷、意識消失、呼吸停止、心停止、全身潮紅、 <u>血管性浮腫</u> 、じん麻疹等のアナフィラキシーを伴うことがある。[8.1、9.1.2 参照] 11.1.2~11.1.3 (省略)	11. 副作用 (省略) 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明) ショックを起こすことがある。呼吸困難、失神、昏迷、意識消失、呼吸停止、心停止、全身潮紅、 <u>血管浮腫</u> 、じん麻疹等のアナフィラキシーを伴うことがある。[8.1、9.1.2 参照] 11.1.2~11.1.3 (省略)

### [改訂理由]

「11. 副作用」の改訂

電子添文の 11.1 重大な副作用のうち、11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明) の項にある“血管浮腫”を“血管性浮腫”に名称変更しました。当該変更は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの依頼に基づく変更であり、重篤副作用疾患別対応マニュアル<sup>[1]</sup> 及び国際的な医学用語集 (MedDRA) 等で使用されている名称に統一するために実施しています。

〈参考資料〉

[1] 重篤副作用疾患別対応マニュアル アナフィラキシー 平成 20 年 3 月 (令和 8 年 2 月改定)

**製品に関するお問い合わせ：**

ブラッコ・ジャパン株式会社 フリーダイヤル：0120-318-170（平日：午前9時～午後5時）

※最新の電子添文は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」及び弊社ホームページにてご参照ください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医薬品に関する情報  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>  
ブラッコ・ジャパン株式会社 <https://www.bracco.com/ja>

製造販売元



**ブラッコ・ジャパン株式会社**  
東京都豊島区南池袋 1-13-21